



INS

Hospitalisation
notwendig?

→JA

Verdachtskriterien

A

Fieber unklarer Fokus (=wenn Pyelonephritis,
Meningitis ausgeschlossen)

Fieber **und/oder** respiratorische Symptome

B

Fieber **und/oder** gastrointestinale Symptome

Diagnostik

A

Corona (2019 nCoV) PCR + RSV/ Influenza* PCR aus NPA

**Resp. Erregerpanel: IPS pflichtig oder besondere Fragestellung*

B

Rotavirus/ Adenovirus im Stuhl + Corona (2019 nCoV) PCR
aus NPA

COVID19 Testung von ambulant Patienten:
nur falls innerhalb Familie Risikoperson lebt

s. Merkblätter Hygienekartei: *Selbstiso./Selbstquarantäne*

Begleitende Eltern des Kindes
mit **Symptomen*** müssen auch getestet werden

*Fieber **und/oder** respiratorische Symptome

Hospitalisation (exkl. IPS/ Neo)

2 Ost

Respiratorischer
Symptomkomplex

Fieber unklarer Fokus

3 West

Gastrointestinaler
Symptomkomplex

«Overflow Infektsymptome»

2 West

Onkologie/Hämatologie
Immunsupprimierte
K&L

1 West

Chirurgische Patienten

Bei ausstehendem bzw. bestätigtem Corona (2019 nCoV) PCR Abstrich gilt :

Kontakt + Tröpfchen Iso

Bettplatz Isolation möglich (s. Hygienekartei)

Eltern: müssen bis zum Erhalt des Testresultats des Kindes im Zimmer (ausser Toilette) bleiben. Wenn Eltern im Verlauf der Hospitalisation symptomatisch → Testung

Bestätigter COVID19:

- Isolierung bis mind. 10 Tage ab Symptombeginn und mind. 48 Std.

Symptomfreiheit (keine Verlaufs-PCR notwendig)

- **Rasche Entlassung** und Heimisolation **bei Besserung des AZ** anstreben