


Enterale Ernährung, Fortifier, Vitamin D- und Eisensubstitution bei Neugeborenen



* MM und Pre-Milch **ohne** Anreicherungen, wenn Wachstum **über**-perzentilenentlang
 Wenn Wachstum "nur" perzentilenentlang, dann Anreicherungen belassen (indirekte Reduktion durch Zunahme vom Stillen)

Maltofer

ab 14. LT (unter MM/FMS/Pre-Milch, **nicht FM85/FGN1**): Maltofer 1.5 mg/kg 12-h bis korr. 6 Monate

Vitamin D3

Ab 10 ml/Mahlzeit: 400-500 IE /Tg

Vorgehen bei Gewicht bei Entlassung P < 10

Gewicht P3-10 und gutes Gedeihen ohne Infatrini im Spital			
Viel MM	motiviert für abpumpen	½ MM ½ MM + Hipp 3%	Nachbetreuung Kinderarzt
	lieber kein abpumpen (Aufwand zu gross zB bei Zwillingen)	½ MM ½ Hipp 16%	
kein MM MM max ½ der Tagesmenge		MM / Hipp 16%	

Gewicht P<3 Gewicht P3-10 und schlechtes Gedeihen ohne Infatrini im Spital Schon Infatrini im Spital (bei der Ernährungsvisite besprochen)			
Viel MM	motiviert für abpumpen	Max 2/8 MM, 6/8 MM+3%	Nachbetreuung Kinderarzt
	lieber kein abpumpen (Aufwand zu gross zB bei Zwillingen)	2-4/8 MM 4-6/8 Infatrini	Nachbetreuung Ernährungsberatung
kein MM MM max ½ der Tagesmenge		MM / Infatrini	