



# Nebenodenentzündung (Epididymitis) - Elternmerkblatt –

Ihr Kind wurde bei uns zur Bettruhe, abschwellenden Massnahmen und entzündungshemmenden Therapie bei einer Nebenhodentzündung aufgenommen. Die Beschwerden waren rückläufig und die weitere Überwachung unauffällig – daher ist der Austritt nach Hause möglich.

## Weiterer Verlauf

- Wir empfehlen das Fortführen der Therapie mit Ibuprofen für weitere 3 Tage sowie körperliche Schonung bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit.
- **Wir empfehlen eine klinische Kontrolle beim Kinder- oder Hausarzt in 3-5 Tagen. Bitte vereinbaren Sie hierfür selbstständig einen Termin.**
- Bei Persistenz oder Verschlechterung der Beschwerden, Fieber oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes empfehlen wir eine zeitnahe ärztliche Wiedervorstellung.

## Verlauf und Prognose bei Nebenhodentzündung

Die Prognose dieser Infektionen ist gut. Bis die Anzeichen der akuten Entzündung abgeklungen sind kann es bis zu 10 Tage dauern. Danach kann es noch ein paar Wochen dauern, bis der Hodensack wieder gänzlich unauffällig ist.

Nicht vollständig ausgeheilte Infektionen können zu einer chronischen Nebenhodentzündung werden. Dabei kann es zu Vernarbungen der Samenwege mit einem möglichen Risiko für die Zeugungsunfähigkeit oder einer unzureichenden Hormonproduktion kommen. Bei länger anhaltenden Beschwerden empfehlen wir daher dringlich die ärztliche Wiedervorstellung.