



## Cochleaimplantat - Elternmerkblatt -

Ihr Kind wurde durch die Kollegen der HNO bei uns operiert. Die bisherige Überwachung bei uns war unauffällig – daher ist der Austritt nach Hause möglich.

**Wir empfehlen eine klinische Kontrolle beim Kinder- oder Hausarzt ca. 10 Tage nach der Operation zur Wundkontrolle. Bitte vereinbaren Sie hierfür selbstständig einen Termin.**

**Wir empfehlen eine umgehende ärztliche Wiedervorstellung, sollte Ihr Kind eine der folgenden Beschwerden entwickeln:**

- Unklares Fieber
- Lokale Entzündungszeichen (Rötung oder Schwellung an der Narbe)
- Verschlechterung des Allgemeinzustands

**Was Ihrem Kind hilft und den Heilungsprozess fördert:**

- Bei Schmerzen dürfen Schmerzmittel gegeben werden. Entsprechende Schmerzmittel haben wir Ihnen mitgegeben oder Ihnen ein Rezept ausgehändigt.

**Dies ist für die nächsten Tage und Wochen zu beachten:**

Eventuell wird ambulant noch ein Kontroll-Computertomogramm oder Röntgenbild durchgeführt werden. Dies wird von den HNO-Ärzten mit Ihnen festgelegt.

Die Erstanpassung des Sprachprozessors erfolgt meist ca. 3-4 Wochen nach der Operation.

Separate Terminaufgebote erfolgen durch die Kollegen der HNO (Audiologie-Abteilung)  Termin: \_\_\_\_\_

Eine klinische Kontrolle in der Sprechstunde des Operateurs erfolgt im Rahmen der ersten Anpass-Termine oder einem separaten Termin ca. 3-5 Wochen postoperativ.

Ein separates Terminaufgebot erfolgt durch die Kollegen der HNO.  Termin: \_\_\_\_\_

Wunde mindestens zwei Wochen trocken und sauber halten. Vorsicht beim Haare-Waschen.

Eine Fadenentfernung entfällt bei resorbierbarem Nahtmaterial.

Klammerentfernung 10-14 Tage postoperativ durch den Kinderarzt.

Sportdispens für \_\_\_\_\_ Wochen.