

Kinderchirurgische Klinik Kinderspital Luzern		RISSQUETSCHWUNDE WUNDNAHT
		Elternmerkblatt
2011		Seite 1 /1

Liebe Eltern,

Bei Ihrem Kind wurde eine Wunde mittels **Naht** versorgt. Für die weitere Behandlung bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten:

- ✓ Wunde trocken halten
- ✓ **Baden** oder Schwimmen erst nach abgeschlossener Wundheilung in 7-10 Tagen (Infektgefahr)
- ✓ Körperliche **Schonung** bis zur abgeschlossenen Wundheilung
- ✓ Wundkontrolle und **Fadenentfernung** in ____ Tagen in der Praxis Ihres Kinder-/Hausarztes
- ✓ **Schmerzmedikamente** bei Bedarf
- ✓ Konsequenter **Sonnenschutz** der Wunde/Narbe im ersten Jahr nach Unfall

- ✓ Bei Rötung, Schwellung, Eiterung, zunehmenden Schmerzen, strichförmiger Rötung und/oder Fieber umgehend Kontrolle in Ihrer Kinder-/Hausarztpraxis (**Wundinfektion**)
- ✓ Bei Wunden am Kopf: Bei auffälliger Müdigkeit, Erbrechen, starken Kopfschmerzen oder Wesensveränderung, bei älteren Kindern auch Gangunsicherheit und/oder Schwindel, in den ersten Tagen nach Unfall umgehende Arztkontrolle (**Gehirnerschütterung**)

- ✓ Ruhigstellung (**Gips**)
 - ☐ ist nicht nötig
 - ☐ Tragen der Schiene bis zur abgeschlossenen Wundheilung

- ✓ **Antibiotische** Prophylaxe
 - ☐ ist nicht nötig
 - ☐ Co Amoxi Mepha für ____ Tage

Mit den besten Wünschen
der Abteilungsarzt/-ärztin