

<b>Kinderchirurgische Klinik Kinderspital Luzern</b>		<b>PHENOLKAUSTIK "PHENOLKOCHER"</b>
		<b>Nachbehandlung</b>
<b>2015 Dr. Lemaréchal</b>		<b>Seite 1 / 1</b>

Merkblatt zur Nachbehandlung nach Phenolkaustik / Operation bei eingewachsenem Zehennagel

Allgemeine Hinweise

- Eine **Wundkontrolle** beim eigenen Kinder-/Hausarzt ist nach 3-4 Tagen empfohlen. Wir bitten Sie, selber einen Termin zu vereinbaren.
- Tägliches **Kamillosanbad**. Danach trocknen lassen (ev. mit Föhn) und Anlage eines **Ialugen-Plus-Verbandes** (Ialugen Plus-Salbe auftragen, Kompresse einmal rund um Zehe wickeln, eine zweite von hinten nach vorne anlegen, selbstklebende Kobanbinde rundherum).
- Duschen erlaubt (mit Verband, danach Kamillosanbad anschliessen und neuer Verband).
- Badekarenz für 2 Wochen.
- Sportverbot 1 Woche.
- Offene Schuhe bis zur abgeschlossenen Wundheilung.
- Nachkontrolle in der Sprechstunde des Operateurs in ca. 2 Wochen.
- Geben Sie **Schmerzmittel** nach dem Bedarf Ihres Kindes.

Wundinfekt

Der Wundinfekt ist eine der häufigsten allgemeinen Komplikationen nach einem operativen Eingriff, und tritt - wenn es dazu kommt – meistens am 3./4 Tag nach der Operation auf. Folgende Zeichen zeigen Ihnen einen Wundinfekt an:

1. zunehmende (pochende) Schmerzen
2. Rötung
3. Überwärmung
4. Schwellung
5. ev. Eiterraustritt aus der Wunde

Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Kinderarzt oder mit uns auf.

Tel. 041/2051'1'11, Dienstarzt Kinderchirurgie verlangen.