

Kinderchirurgische Klinik Kinderspital Luzern		UCNST Uretero-Cysto-Neo-Stomie
		Aufklärung
2015		Seite 2 / 2

- ⌘ • **Therapiealternativen**
 - Unterspritzung bei VUR II°-III° (IV°)
 - Dauerprophylaxe
- ① • **Mögliche allgemeine Komplikationen**
 - Blutung, Blasentamponade
 - Infektion
- **Mögliche operationsspez. Komplikationen**
 - Blasentenesmen bei liegendem Blasenkatheter
 - Rezidiv VUR, Obstruktion, Leck, Verletzung Samenleiter und Darm, neurogene Blasenentleerungsstörung
- **Spezielle Risikofaktoren des Patienten**
- ➞ • **Behandlungs- und Pflegeplan nach der OP**
 - Kaspar-Blasenkatheter für 8 Tage und 1 Ureterkatheter pro Harnleiter.
 - UK für 7 Tage (Modellage 10-14 Tage). BK nach 7 Tagen abklemmen und am Folgetag ziehen ▶ Demissio (Modellage: Demissio am Folgetag nach UK-Entfernung)
 - Nachkontrollen nach 6 Wochen(MAG-3-Szintigraphie,US)
 - nach 6 und 12 Monaten US
 - nach 12 Monaten im Ausnahmefall MCUG
- ? • **Fragen und Wünsche der Eltern**

Die verantwortliche Person (Elternteil oder gesetzl. Vertreter) hat sich nach der Aufklärung für die Operation (inkl. besprochenen Erweiterungen) entschieden.

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Patienten
(Eltern, Vormund, etc.)

Patient (> 12-14 Jahre alt, urteilsfähig)

Unterschrift Arzt/Ärztin

Luzern,