



Version 05/17, rev. 04/20

Protokoll INSURE

Angaben zum Patient:

SSW _____ Gewicht _____ Alter in Std. _____
CPAP / DuoPAP _____ FiO2 _____

Medikamentenvorbereitung:

Atropin 20 mcg/kg iv. _____mcg/Dosis _____ml / Dosis (0.2ml/kg)
Verdünnung: Ampulle 0.5mg/1ml mit 4 ml NaCl 0.9%: 0.1mg/ml

Remifentanyl 2mcg/kg _____mcg/Dosis _____ml / Dosis (0.2ml/kg)
Verdünnung: Ampulle Ultiva 1 mg Trockensubstanz in 100ml NaCl 0.9%, hiermit 10mcg/ml
Achtung: sehr langsam spritzen, da Gefahr der Thoraxrigidität. Bitte 2 Dosen aufziehen.

Succinylcholin 2mg/kg _____mg/Dosis _____ml / Dosis (0.4ml/kg)
Verdünnung: Ampulle Succinolin = 100mg/2ml, 1 ml davon in 9 ml NaCl 0.9%, hiermit 5 mg/ml.
Merke: unmittelbar nach Remifentanyl spritzen. Bitte 3 Dosen aufziehen.

Durchführung:

Anzahl Dosis: Atropin _____ Remifentanyl _____ Succinylcholin _____
C-MAC / konvent. Laryngoskopie Grösse ETT _____ Amp. Curosurf _____
Zeit zwischen Verabreichung und Extubation _____ Minuten keine Extubation
Überbrückung mit Evita / Hamilton / Bebeutelung
Komplikationen / Zusätzliche Medikamente _____

Beurteilung eine Stunde nach Prozedur:

Einstellungen: CPAP / DuoPAP / HFNC _____ FiO2 _____

Bemerkungen:

OA/LA/CA _____