



Vorgehen Allergische Reaktion

	Einteilung nach H. L. Mueller	Notfall-Therapie	Procedere
<p>Leichte allergische Reaktion</p> 	<p>Grad I Urticaria, Pruritus Malaise, Angst</p>	<p>Antihistaminikum <2 Jahre: Feniallerg 20 Trpf. 2-6 Jahre: Xyzal 10 Tropfen 6-12 Jahre: Xyzal 5mg 1 Tbl. >12 Jahre: Xyzal 5mg 2 Tbl.</p>	<p>Ambulante Überwachung Notfallset mit Antihistaminikum, Steroid</p> <p>Notfallplan</p> <p>Abklärung durch Kinderarzt/Hausarzt</p>
	<p>Grad II Angioödem oder Grad I-Symptome plus mind. 2: Nausea, Erbrechen, Bauch- Schmerzen, Diarrhoe, Schwindel</p>	<p>Zusätzlich Steroide < 6 Jahre: Betnesol 0.2mg/kg 6-12 Jahre: Spiricort 50mg 1 Tbl. >12 Jahre: Spiricort 50mg 2 Tbl.</p>	<p>Ambulante Überwachung Notfallset mit Antihistaminikum, Steroid Inklusive Epipen/Jext (Instruktion!) Notfallplan</p> <p>Abklärung durch Kinderarzt/Hausarzt</p>
<p>Schwere allergische Reaktion = Anaphylaxie</p> 	<p>Grad III Grad I/II-Symptome plus Atemnot: Dyspnoe, Wheezing, Stridor Grad I/II plus mind. 2: Dysphagie, Dysarthrie, Heiserkeit Schwäche, Verwirrtheit, Todesangst</p>	<p>Primär Adrenalin < 7.5kg: 0.01mg/kg i.m. 7.5-25kg: Adrenalin 0.15mg i.m. >25kg: Adrenalin 0.3mg i.m.</p> <p>O2-Gabe</p>	<p>Bestimmung Serumtryptase</p> <p>(Teil-) Stationäre Überwachung (rebound nach 4-6 Stunden möglich)</p> <p>Notfallset mit Antihistaminikum, Steroid Inklusive Epipen/Jext (Instruktion!) Notfallplan</p> <p>Abklärung Kinderspital/Allergologe</p>
	<p>Grad IV Symptome Vorgrade plus mehrere: Blutdruckabfall (Kraftverlust, starker Schwindel), Kollaps, Koma, Zyanose, Urin-/Stuhlinkontinenz</p>	<p>WHEEZING zusätzlich: Ventolin 6 Hübe/12 Hübe (<6J/>6J)</p> <p>Antihistaminika und Steroide</p> <p>IV-Zugang: 20mg/kg Ringerfundin Clemastin 0.05mg/kg (max. 2mg) Methylprednisolon 2mg/kg</p>	